



jardins du nord



Glossaire concernant les champignons de C à D

Le glossaire donne la définition des termes scientifiques ou particuliers, inhabituels pour les néophytes



caducifolié (arbre) : pourvu de feuilles caduques

calcicole : qui aime les stations calcaires

calciphile : qui manifeste une certaine préférence pour les sols calcaires

campanulé : en forme de fleur de campanule, c'est-à-dire hautement convexe

canalicule : petit canal situé au centre du stipe de certaines espèces

canaliculé : fistuleux

cantharelloïde (silhouette) : évoquant la chanterelle

capillaire : fin comme un cheveu

carbonicole : qui pousse sur les charbonnières (bois brûlés)

carné : couleur chair

carpophore : terme déconseillé désignant le sporophore des champignons charnus

cartilagineux : assez ferme et flexible, comme du cartilage

caséeux (consistance) : rappelant le lait caillé, donc un peu crémeux et cassant

cassant : fragile et cassant net

caulinaire : relatif au stipe

caulocutis : revêtement du stipe

caulocystide : cystide présente sur la surface du stipe

caverneux (stipe) : présentant de grosses lacunes irrégulières, visibles en coupe

cédricole : qui pousse sur ou près des cèdres

cèpe : terme réservé aux bolets du groupe de *Boletus edulis* (souvent employé de manière abusive pour n'importe quel bolet)

céracé : ayant le contact de la cire

cercle de fées : ronds de sorcières

cérébelleux : contourné comme une cervelle

cespiteux (port) : en touffe assez dense

chagriné : finement et irrégulièrement crispé ou ruguleux

charbonnière : endroit où on a brûlé du bois où il reste du charbon de bois

charmaie = charmille : formation végétale dominée par les charmes

charnu : dont la chair est épaisse

cheilocystides : cystides marginales

chiné : présentant des chinures, dessins colorés en zigzag sur fond de couleur différente

chlamydospore : spore de multiplication végétative particulière

chrysocystides : cystide munie d'une inclusion réfringente, jaune dans l'ammoniaque et fixant le bleu de crésyl

cilié : muni de cils, de poils sur la marge

cinabre (couleur) : rouge vif, un peu orangé

circoncise (volve) : présentant un bourrelet net, à angle droit

cireux : ayant la consistance, le toucher ou l'aspect de la cire

clavarioïde : en forme de clavaire

clavé : en massue

clavule : petite massue

cline : suffixe invoquant un penchant pour un facteur (souvent écologique) donné

clypéiforme : en forme de bouclier

cocardé : présentant des couleurs différentes, disposées en 2 ou 3 zones concentriques

collarium : membrane réunissant les lames à proximité du stipe et ménageant un petit espace circulaire autour

collective (espèce) : taxon dans lequel on peut distinguer plusieurs espèces en faisant une analyse plus fine des caractères

collinéen (étage) : étage de végétation situé entre la plaine et l'étage montagnard. Limite supérieure vers 800-1000 m

conchoïde : en forme de coquillage

concolore : de même couleur

confluent : se dirigeant vers un même point

congoophile : présentant une affinité pour la coloration du rouge congo (en microscopie)

congophobe : repoussant la coloration par le rouge Congo

conné (stipe) : réuni par quelques individus avec une base soudée commune

coprophile : qui aime (pousse sur) les excréments

corraloïde : en forme de corail

cordiforme : en forme de coeur

cordon mycélien : agglomérat d'hyphes mycéliennes visibles microscopiquement

cortex : zone la plus externe d'un élément, généralement cylindrique

corticioïde : en forme de croûte

corticole : qui pousse sur les écorces

cortine : voile partiel filamenteux

coumarinique (odeur) : rappelant l'odeur de la coumarine, donc de la flouve odorante qui est voisine de celle du foin

cratériforme : en forme de coupe

crénelé (marge etc) : muni de créneaux ou de dents peu aigües

crispé : à surface finement contractée

cunéiforme (lames) : triangulaire, en forme de coin

cupuliforme : en forme de coupe

cuticule : terme impropre désignant les revêtements des sporophores de champignons supérieurs. Normalement utilisé en botanique (surface vernissée de certaines feuilles), ce terme pourrait éventuellement être employé pour désigner une surface vernissée de certains polypores

cutis : désigne le revêtement, d'un point de vue microscopique, au moins comme radical.

cyathiforme : en forme de cyathe, de coupe profonde

cystides : éléments stériles se trouvant au sein de l'hyménium des Basidiomycotina



décolorant : perdant ses couleurs, généralement en vieillissant

déhiscence : mécanisme d'ouverture d'une structure quelconque, initialement close

déliquescent : qui se transforme en liquide

denticulé : qui présente de petites dents

déprimé : plus ou moins creux

détersile (voile, flocons) : qui disparaît facilement

détritique : qui pousse parmi les débris (souvent végétaux) divers

dextrinoïde : qui présente une réaction brun-rouge au contact de l'iode

dichotomique : qui se divise régulièrement en 2

diffracté : divisé, excorié

dimidié (chapeau) : greffé par le côté et étagé


dissépiment : désigne la paroi séparant les tubes

distal : relatif à la partie la plus éloignée



Bonne récolte



Fiche :  2020 JDN jardins du nord (Ancienne fiche d'Eveliotis)