



Fiche de culture : L'Achillée des Marais



L'Achillée des Marais est aussi appelée **Achillée Sternutatoire**, "Achillée Ptarmique", "Bouton d'argent", "Herbe à Eternuer" et "Passe-Pierre".

Le plus fréquemment on la nomme **Achillée Sternutatoire**

Elle fait partie des fleurs sauvages, et se plaît plus particulièrement dans les lieux humides, près des bords de bassins...

L'achillée des marais peut devenir envahissante car elle possède un rhizome traçant très vigoureux.

Il faut donc la contrôler régulièrement ou la cultiver en bac.

Les abondantes fleurs de l'achillée des marais ressemblent à des petites pâquerettes.

Nom commun féminin : Achillée Sternutatoire

Nom latin : Achillea Ptarmica

Famille : Astéracées

Origine : Europe et Asie

Type de végétation : Vivace ornementale rhizomateuse à fleurs. Très rustique, elle supporte des températures allant jusqu'à **-20°C**.

Type de feuillage : Feuilles caduques, lancéolées, étroites et vertes.

Mode de multiplication : Semis et division.

Destination : Massif, plate-bande, rocaille.

Qualité du sol : Ameubli, humide et acide.

Amendement et Fertilisation : Ils ne sont pas nécessaires.

Exposition : Ensoleillée.

Hauteur : 50 à 80 cm avec une croissance rapide.

Espacement : 50 cm.

Profondeur de plantation : 1 cm de recouvrement des graines avec de la terre affinée.

Culture et Entretien :

- **Semer** en pépinière ou en pleine terre du mois d'avril au mois de juin.
- **Repiquage** de plants en mai après les gelées.
- Les plants achetés en conteneurs **peuvent être plantés toute l'année** dans les régions douces principalement. **Les périodes les plus propices** étant malgré tous les mois de mars, avril, octobre ou novembre.
- **La division** des touffes s'effectue au printemps. Une division est conseillée tous les trois ans pour rajeunir les pieds.
- **A l'automne**, à la fin de la floraison, rabattre les touffes.
- **En fin d'hiver**, supprimer les tiges un peu trop sèches et biner bien autour du pied.
- **En été, pailler** le pied pour conserver la fraîcheur de la terre et limiter le développement des mauvaises herbes.
- **Supprimer** les fleurs fanées régulièrement afin de favoriser le renouveau de la floraison.
- **En rabattant** bien la touffe **vers la mi-août** on peut obtenir une remontée florale automnale assez conséquente.

Période de floraison : Corymbe de fleurs du mois de juillet au mois de septembre.

Couleur : Blanc.

Parasites : Pucerons.

Maladies : Oïdium.

Plantes compagnes :

C'est une bonne compagne.

Plantes incompatibles :

Il n'y a pas d'incompatibilité avérée.

Quelques variétés :

- **Achillea Millefolium** : Espèce appelée Achillée Millefeuille.
- **Achillea Odora** : Espèce appelée Achillée Odorante
- **Achillea Filipendula** : Espèce appelée Achillée Eupatoire
- **Achillée Sternutatoire "Boule de Neige"** : Variété à fleurs doubles et blanches.
- **Achillée Sternutatoire "La Perle"** : Variété à grandes fleurs doubles et blanches.
- **Achillée Sternutatoire "Nana Compacte"** : Variété naine d'environ 20 cm de haut.



Bonne culture

Fiche : 🍀 2024 JDN jardins du nord

Photo : du net

Texte : Extrait d'un forum laissé à l'abandon suite au décès des administrateurs.
Merci à eux pour le travail qu'ils ont accompli.